

米国の乳牛における高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）への感染事例について

近時、米国においては、乳量の減少、食欲低下等がみられた乳牛におけるHPAIウイルス（H5N1亜型）の感染が複数（4月2日（現地）までに5州12農場）確認されています。

これらの事例については、渡り鳥が感染源とみられていますが、ミシガン州の牛群の事例では牛から牛への感染の可能性が排除できないとされているなど、引き続き、米国当局による調査が続いています。

HPAI等の野鳥からの感染防止を図るため 衛生管理の徹底をお願いします。

- ✓ 給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所に野鳥の排せつ物等が混入しないよう、防鳥ネット等の設置・修繕
- ✓ 消石灰等による畜舎周辺の消毒、飲水消毒
- ✓ 手指・長靴・車両などの消毒徹底
- ✓ 畜舎周辺の清掃・整理・整頓、周囲の樹木の剪定
- ✓ ネズミ等の野生動物侵入防止対策
- ✓ 農場関係者以外の衛生管理区域への立入制限



毎日、飼養家畜の健康状態を確認するとともに、飼養する牛に乳量の減少、食欲低下等がみられた場合には、群から隔離して管理し、獣医師又は家畜保健衛生所に相談してください

【姫路家畜保健衛生所】 TEL: 079-240-7085 緊急時: 090-5967-0036・0037
【朝来家畜保健衛生所】 TEL: 079-673-2331 緊急時: 090-5967-0038・0039
【淡路家畜保健衛生所】 TEL: 0799-45-2411 緊急時: 090-5967-0040・0041

最新情報は



兵庫県の家保ホームページ

